

Vízvári László

# **Alapápolástan – Az emberi szükségletek rendszere**

**MK-6617  
MELLÉKLET**

**Bármely ok miatt egészségügyi ellátásra kerülő beteg esetében esetlegesen fennálló vizeletinkontinencia miatt javasolt kérdések**

1. Van-e Önnek akaratlan (köhögésre, nevetésre, tüsszentésre, emelésre vagy parancsoló vizelet inger mellett, vagy attól függetlenül jelentkező) vizeletvesztése?
  - a) igen
  - b) nem
  
2. Panaszainak mérséklésére milyen segédeszközt használ?
  - a) betétet
  - b) nadrágpelenkát
  - c) condom urinalt
  - d) katétert
  - e) semmit
  
3. Milyen súlyosak a panaszai?
  - a) enyhe (csöpög)
  - b) közepes (szivárog)
  - c) súlyos (folyik)
  
4. Milyen szakorvosnál járt emiatt?
  - a) urológus
  - b) nőgyógyász
  - c) egyéb, éspedig: \_\_\_\_\_
  - d) nem járt szakorvosnál
  
5. Kapott-e megfelelő kezelést vagy segítséget panaszaira?
  - a) igen
  - b) nem
  
6. Szed-e inkontinencia gátló gyógyszert, és ha igen, mit szed?
  - a) igen, \_\_\_\_\_
  - b) nem
  
7. Szed-e vízhajtó gyógyszert, és ha igen, mit szed?
  - a) igen, \_\_\_\_\_
  - b) nem
  
8. Volt-e műtétje vizeletinkontinencia miatt?
  - a) igen
  - b) nem

Forrás: [https://www.makut.hu/files/EEM\\_szakmai\\_iranyelve.pdf](https://www.makut.hu/files/EEM_szakmai_iranyelve.pdf)

web: [www.muszakikiado.hu](http://www.muszakikiado.hu)  
e-mail: [info@muszakikiado.hu](mailto:info@muszakikiado.hu)

©Műszaki Könyvkiadó Kft.  
Minden jog fenntartva!



### Az ápoló által kivitelezett borotválkozáshoz szükséges eszközök:

- védőkesztyű,
- törülköző/betegalátét a beteg mellkasára,
- melegvíz mosdótálban,
- a beteg saját borotvája (amennyiben nincs kórházi egyszerhasználatos borotva),
- borotvahab vagy -gél,
- borotválkozás utáni arcápoló szesz vagy balzsam,
- tükör.



● Szájápoláshoz szükséges eszközök lehetnek:

- kézfertőtlenítő és gumikesztyű,
- orr-száj maszk, esetleg védőszemüveg,
- ruházat védelme (beteg alátét),
- papírvatta,
- orvossal egyeztetett szájnyalókahártya fertőtlenítő oldat (megfelelő hígításban),
- szájterpesz (eszméletlen vagy zavart tudatú betegnél),
- nyelvlapoc, gézzel bevont nyelvlapoc,
- steril gézlap,
- váladékszívó és szívókatéter,
- pohár víz,
- fogkefe, szívóval összeköthető fogkefe,
- fogkrém, szájvíz, fogselyem,
- legalább 20 ml-es fecskendők,
- glicerines pálca (Pagavit pálca),
- vesetál.



## 2.5.2. Légúti váladékok eltávolítása invazív módszerekkel

(Tk. 25-26. oldal)



Központi szívó  
(Tk. 25. old.)



Akkumulátoros váladék szívó  
(Tk. 25. old.)



Szívás megszakító (fingertip)  
(Tk. 25. old.)



Orális szívókatéterek  
(Tk. 25. old.)



Lágy szívó  
(Tk. 25. old.)



Nyitott endotrachealis leszívókatéter  
(Tk. 25. old.)



Zárt endotrachealis leszívókatéter  
(Tk. 26. old.)